


Szczepienia od 12 miesiąca życia do 36 miesiąca życia:



■ szczepienia obowiązkowe (bezpłatne) ■■ szczepienia obowiązkowe (alternatywna realizacja, płatne) ■■ szczepienia zalecane (płatne)

Szczepienia oferowane w ramach poszczególnych programów:

- **6 w 1** (DTPa + IPV + Hib + HBV) - szczepionka skojarzona przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelulama), polio, Hib, wzv B
- **5 w 1** (DTPa + IPV + Hib) - szczepionka skojarzona przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelulama), polio, Hib
- **3 w 1** - (DTPw) szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (pełnokomórkowa)
- **MMR** - szczepionka skojarzona przeciwko odrze, śwince i różyczce
- **Hib** - szczepionka przeciwko Hib (Haemophilus influenzae typu b)
- **WZW B** - szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B
- **WZW A** - szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Legenda

- 📌 szczepionki podawane w postaci zastrzyku
- 📌** rekomendowany termin podania dawki uzupełniającej szczepionki przeciwko pneumokokom w 13/14 lub 16/18 miesiącu życia w zależności od preparatu, którym rozpoczęto szczepienie w 2 m.ż.; schemat szczepienia 3+1 (4 dawki)
- 📌*** skoniugowana szczepionka przeciw meningokokom grupy A, C, W-135, Y (4-walentna), stosowana od ukończenia 12 m.ż. w schemacie jednodawkowym u dzieci nie szczepionych w 1 r.ż.;
- 📌**** szczepionka polisacharydowa (nieskoniugowana) przeciwko meningokokom grupy A, C, W-135, Y (4-walentna); stosowana powyżej 2 r.ż. u dzieci nie szczepionych wcześniej szczepionką skoniugowaną

Szczepionki skojarzone należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów i dokumentami rejestracyjnymi

Zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych, szczepienia p/zakażeniem Streptococcus pneumoniae są obowiązkowe (bezpłatne):

- a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:
- po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego,
 - przebiegającymi z wyciekami płynu mózgowordzeniowego, zakażone HIV,
 - po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego;
 - szczepionka polisacharydowa (nieskoniugowana) przeciwko meningokokom grupy A, C, W-135, Y (4-walentna); stosowana powyżej 2 r.ż. u dzieci nie szczepionych wcześniej szczepionką skoniugowaną
- 📌* Obowiązkowe (bezpłatne) szczepienie przeciwko ospie wietrznej - sprawdź w PSO 2012¹.

b) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorujące na:

- przewlekłe choroby serca,
- schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczna, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytozę wrodzoną,
- asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym,
- przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy,
- pierwotne zaburzenia odporności,
- choroby metaboliczne, w tym cukrzyca,
- przewlekłe choroby płuc, w tym astmę;

c) u dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

Szczepienia te są zalecane (płatne) u dzieci:

- zdrowych w różnych grupach wieku (szczepionka skoniugowana),
- dzieci z określonych grup ryzyka (szczepionka skoniugowana),
- w niektórych grupach osób dorosłych (szczepionka polisacharydowa).¹

1. Program Szczepień Ochronnych na rok 2012. Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2011 r. (poz. 71)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych z 18 sierpnia 2011