





















































Szczepienia do 12 miesiąca życia:



	Alteratywny kalendarz szczepień w 1 r.ż z wykorzystaniem wybranych, płatnych szczepionek zalecanych ^{1,2}				Szczepienia obowiązkowe (bezpłatne) w 1 r.ż i wybrane szczepienia zalecane (płatne)							Alteratywny kalendarz szczepień w 1 r.ż z wykorzystaniem wybranych, płatnych szczepionek zalecanych				
	Program na 6-tkę				Schemat szczepień wg Programu Szczepień Ochronnych ^{1,2}							Program na 5-tkę				
Suma wkłuć w 1-szym roku życia	 x 5 + Szczepienia zalecane				 x 12 + Szczepienia zalecane							 x 7 + Szczepienia zalecane				
Po urodzeniu	WZW B + gruźlica 				WZW B + gruźlica 							WZW B + gruźlica 				
	6 w 1	Pneumokoki	Meningokoki	Rotawirusy	Błonica, Tęžec, Krztusiec (DTPw) 3 w 1	Hib	Polio (IPV)	WZW B	Pneumokoki	Meningokoki	Rotawirusy	5 w 1	WZW B	Pneumokoki	Meningokoki	Rotawirusy
2 miesiąc			 **							 **					 **	
3/4 miesiąc			 **							 **					 **	
5/6 miesiąc																
7 miesiąc																
10 miesiąc			 **							 **					 **	

■ szczepienia obowiązkowe (bezpłatne) ■ szczepienia obowiązkowe (alternatywna realizacja, płatne) ■ szczepienia zalecane (płatne)

Szczepienia oferowane w ramach poszczególnych programów:

- **6 w 1** (DTPa + IPV + Hib + HBV) - szczepionka skojarzona przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), polio, Hib, wzv B
- **5 w 1** (DTPa + IPV + Hib) - szczepionka skojarzona przeciwko: błonicy, tężcowi, krztuścowi (acelularna), polio, Hib
- **3 w 1** (DTPw) - szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi (pełnokomórkowa)
- **Hib** - szczepionka przeciwko Hib (Haemophilus influenzae typu b)
- **WZW B** - szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Legenda

-  szczepionki podawane w postaci zastrzyku
-  szczepionki podawane doustnie
- (♣) rekomendowany termin podania trzeciej dawki szczepionki przeciwko rotawirusom, jeśli do uodpornienia wybrano szczepionkę o 3-dawkowym schemacie stosowania
- ** skoniugowana szczepionka przeciw meningokokom grupy C, stosowana od 2 m.ż. do 12 m.ż. w schemacie 2+1 (3 dawki); trzecia dawka zalecana po sześciu miesiącach od dawki drugiej;

Szczepionki skojarzone należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów i dokumentami rejestracyjnymi

Zgodnie z aktualnym Programem Szczepień Ochronnych, szczepienia p/zakażeniem Streptococcus pneumoniae są obowiązkowe (bezpłatne):

a) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia:

- po urazie lub z wadą ośrodkowego układu nerwowego, przebiegającymi z wyciekami płynu mózgoworodzeniowego,
- zakażone HIV,
- po przeszczepieniu szpiku, przed przeszczepieniem lub po przeszczepieniu narządów wewnętrznych lub przed wszczepieniem lub po wszczepieniu implantu ślimakowego;

b) dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 5 roku życia chorujące na:

- przewlekłe choroby serca,
- schorzenia immunologiczno-hematologiczne, w tym małopłytkowość idiopatyczną, ostrą białaczkę, chłoniaki, sferocytosę wrodzoną,
- asplenię wrodzoną, dysfunkcję śledziony, po splenektomii lub po leczeniu immunosupresyjnym,
- przewlekłą niewydolność nerek i nawracający zespół nerczycowy,
- pierwotne zaburzenia odporności,
- choroby metaboliczne, w tym cukrzycę,
- przewlekłe choroby płuc, w tym astmę;

c) u dzieci od 2 miesiąca życia do ukończenia 12 miesiąca życia urodzone przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub urodzone z masą urodzeniową poniżej 2500 g.

Szczepienia te są zalecane (płatne) u dzieci:

- zdrowych w różnych grupach wieku (szczepionka skoniugowana),
- dzieci z określonych grup ryzyka (szczepionka skoniugowana),
- w niektórych grupach osób dorosłych (szczepionka polisacharydowa).¹

1. Program Szczepień Ochronnych na rok 2012. Załącznik do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 października 2011 r. (poz. 71)

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych z 18 sierpnia 2011